

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

HENILOT®
NILOTINIB 150 mg y 200 mg
Cápsulas duras

Industria Argentina

Venta Bajo Receta Archivada

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. QUÉ ES HENILOT® Y PARA QUÉ SE UTILIZA
2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR HENILOT®
3. CÓMO TOMAR HENILOT®
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
5. CONSERVACIÓN DE HENILOT®
6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

1. QUÉ ES HENILOT® Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Qué es HENILOT®

HENILOT® es un medicamento que contiene un principio activo denominado Nilotinib.

Para qué se utiliza HENILOT®

HENILOT® está indicado para el tratamiento de:

- Pacientes adultos y pediátricos con Leucemia Mieloide Crónica (LMC) cromosoma Filadelfia positivo, de nuevo diagnóstico, en fase crónica.
- Pacientes pediátricos con LMC cromosoma Filadelfia positivo, en fase crónica, con resistencia o intolerancia a un tratamiento previo, incluido imatinib.
- Pacientes adultos con LMC cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica y en fase acelerada, con resistencia o intolerancia a un tratamiento previo, incluido imatinib. No se dispone de datos de eficacia en pacientes con LMC en crisis blástica.

Cómo actúa HENILOT®

En pacientes con LMC, un cambio en el DNA (material genético) genera una señal que hace que el organismo produzca glóbulos blancos anómalos. HENILOT® bloquea esta señal y por tanto interrumpe la producción de estas células.

Control durante el tratamiento con HENILOT®

Durante el tratamiento se van a realizar controles de forma regular, incluyendo análisis de sangre. Estos análisis van a controlar:

- La cantidad de células sanguíneas en el organismo (glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas) para comprobar si HENILOT® es bien tolerado.
- La función del páncreas y del hígado del organismo para comprobar si HENILOT® es bien tolerado.
- Los electrolitos del cuerpo (potasio, magnesio). Estos son importantes en el funcionamiento del corazón.
- El nivel de azúcar y grasas en la sangre.

También se controlará la frecuencia cardiaca utilizando una máquina que mide la actividad eléctrica del corazón (una prueba llamada "ECG").

Si su médico evaluará de forma regular su tratamiento y decidirá si debe continuar tomando HENILOT®. Si le indica que suspenda este medicamento, le seguirá haciendo controles de LMC y en caso necesario, le puede indicar que reinicie el tratamiento con HENILOT®.

Si tiene cualquier pregunta sobre cómo funciona HENILOT® o la causa por la que le han prescrito a usted o a su hijo el medicamento, consulte con su médico.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR HENILOT®

Siga cuidadosamente todas las instrucciones de su médico, aunque éstas sean diferentes de la información general contenida en este prospecto.

No tome HENILOT®

- Si es alérgico al Nilotinib o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Si cree que puede ser alérgico, consulte a su médico **antes de tomar HENILOT®**.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar HENILOT®:

- Si ha sufrido con anterioridad acontecimientos cardiovasculares como un ataque al corazón, dolor en el pecho (angina), problemas con el aporte de sangre a su cerebro (ictus) o problemas con el flujo de sangre a su pierna (claudicación) o si tiene factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares como presión sanguínea alta (hipertensión), diabetes o problemas con el nivel de grasas en su sangre (alteraciones de los lípidos).
 - Si tiene una **alteración del corazón**, como una señal eléctrica anómala llamada «prolongación del intervalo QT».
 - Si recibe **tratamiento con medicamentos** que bajan el colesterol en sangre (estatinas) o que afectan el ritmo cardíaco (antiarrítmicos) o el hígado (ver "Uso de HENILOT® con otros medicamentos").
 - Si sufre falta de potasio o magnesio.
 - Si tiene una alteración del hígado o del páncreas.
 - Si tiene síntomas como facilidad de aparición de hematomas, sensación de cansancio o dificultad al respirar o ha presentado infecciones de forma repetida.
 - Si ha sufrido una intervención quirúrgica que ha supuesto la extirpación del estómago completo (gastrectomía total).
 - Si alguna vez ha tenido o podría tener en este momento una infección por el virus de la hepatitis B. Esto se debe a que HENILOT® podría hacer que la hepatitis B se volviese activa de nuevo, lo que puede resultar mortal en algunos casos. El médico deberá comprobar atentamente si hay signos de esta infección antes de comenzar el tratamiento.
- Si alguno de estos casos le es aplicable a usted o a su hijo, informe a su médico.

Durante el tratamiento con HENILOT®

- Si sufre un desmayo (pérdida de conciencia) o tiene un ritmo cardíaco irregular mientras está tomando este medicamento, **informe a su médico inmediatamente** pues esto puede ser un signo de un problema grave del corazón. La prolongación del intervalo QT o bien un ritmo cardíaco irregular pueden provocar la muerte súbita. Se han notificado casos poco frecuentes de muerte súbita en pacientes que toman HENILOT®.
- Si sufre palpitations repentina del corazón, debilidad muscular grave o parálisis, convulsiones o cambios repentinos de comportamiento o nivel de alerta, informe a su médico inmediatamente puesto que puede ser un signo de una rotura rápida de células cancerosas denominado síndrome de lisísis tumoral. Se han notificado casos raros de síndrome de lisísis tumoral en pacientes tratados con HENILOT®.
- Si desarrolla dolor en el pecho o malestar, entumecimiento o debilidad, problemas al caminar o con el habla, dolor, decoloración o sensación de frío en una extremidad, informe a su médico inmediatamente pues esto puede ser un signo de un acontecimiento cardiovascular. Se han comunicado casos de acontecimientos cardiovasculares graves incluyendo problemas con el flujo de sangre a la pierna (enfermedad arterial oclusiva periférica), enfermedad isquémica del corazón y problemas con el aporte de sangre al cerebro (enfermedad isquémica cerebrovascular) en pacientes que toman HENILOT®. Su médico debe evaluar el nivel de grasas (lípidos) y azúcar en su sangre antes de comenzar el tratamiento con HENILOT® y durante el tratamiento.
- Si desarrolla hinchazón de los pies o de las manos, hinchazón generalizada o aumento rápido de peso, informe a su médico pues éstos pueden ser signos de retención grave de líquidos. Se han comunicado casos poco frecuentes de retención grave de líquidos en pacientes tratados con HENILOT®. Si son los padres del niño que está en tratamiento con HENILOT®, indique al médico si alguna de las condiciones antes descritas, le suceden a su hijo.

Niños y adolescentes

HENILOT® se utiliza para tratar niños y adolescentes con LMC. No existe experiencia del uso de este medicamento en niños menores de 2 años de edad. No existe experiencia en niños menores de 10 años de edad de nuevo diagnóstico y hay poca experiencia en menores de 6 años de edad de pacientes que no obtienen beneficio con el tratamiento anterior para la LMC, incluido imatinib. No se conocen los efectos a largo plazo del tratamiento con HENILOT® en niños durante largos períodos de tiempo.

Algunos niños y adolescentes que están en tratamiento con HENILOT® podrían tener un crecimiento más lento de lo normal. Su médico controlará el crecimiento en sus visitas periódicas.

Otros medicamentos y HENILOT®

HENILOT® puede interferir con algunos medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. Estos incluyen, en particular:

- Antiarrítmicos, utilizados para tratar el ritmo cardíaco irregular.
- Clorquina, halofantrina, clartromicina, haloperidol, metadona, moxifloxacina, medicamentos que pueden tener un efecto no deseado sobre la actividad eléctrica del corazón.
- Ketonazol, itraconazol, voriconazol, claritromicina, teltritromicina, utilizados para tratar infecciones.
- Ritonavir, un medicamento del grupo de las "antiproteasas" utilizado para tratar el VIH.
- Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, utilizados para tratar la epilepsia.
- Rifampicina, utilizada para tratar la tuberculosis.
- Hierba de San Juan, un producto derivado de las plantas utilizado para tratar la depresión y otras situaciones (también conocido como *Hypericum perforatum*).
- Midazolam, utilizado para aliviar la ansiedad antes de la cirugía.
- Alfentanil y fentanilo, utilizados para el tratamiento del dolor y como sedantes antes o durante la cirugía o procedimientos médicos.
- Ciclosporina, sirolimus y tacrolimus, medicamentos que suprimen la habilidad de "auto-defensa" del cuerpo y luchan contra infecciones y que se usan frecuentemente para prevenir el rechazo a órganos trasplantados tales como el hígado, corazón o riñón.
- Dihidroergotamina y ergotamina, utilizadas para tratar la demencia.
- Lovastatina, simvastatina, utilizadas para tratar los niveles elevados de grasas en sangre.
- Warfarina, utilizada para tratar alteraciones de la coagulación (como coágulos en la sangre o trombosis).
- Atenzapina, terfenadina, cisaprida, pimozida, quinidina, bepridil o alcaloides ergotínicos (ergotamina, dihidroergotamina).

Deberá evitarse el uso de estos medicamentos durante el tratamiento con HENILOT®. Si está tomando alguno de estos fármacos, su médico podrá recetar otros medicamentos alternativos.

Si está tomando estatinas (un tipo de medicamentos que bajan el colesterol en sangre), hable con su médico o farmacéutico. Si utiliza HENILOT® con ciertas estatinas éste podría aumentar el riesgo relacionado con las estatinas de problemas musculares, que en raras ocasiones puede provocar una degeneración grave de los músculos (rabdomiólisis) que puede acabar en daño en los riñones.

Además, informe a su médico o farmacéutico antes de tomar HENILOT® si está tomando cualquier antíácido, que son medicamentos contra la acidez de estómago. Estos medicamentos se deben tomar separadamente de HENILOT®.

- Bloqueadores de H2, que disminuyen la producción de ácido en el estómago. Los bloqueadores H2 se deben tomar aproximadamente 10 horas antes y aproximadamente 2 horas después de tomar HENILOT®.
- Antíácidos como los que contienen hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y simeticona, que neutraliza la elevada acidez en el estómago. Estos antíácidos se deben tomar aproximadamente 2 horas antes o aproximadamente 2 horas después de tomar HENILOT®.

También debe informar a su médico si ya está tomando HENILOT® y le recetan un nuevo medicamento que no ha tomado anteriormente durante el tratamiento con HENILOT®.

Toma de HENILOT® con alimentos y bebidas

No tome HENILOT® junto con las comidas. Los alimentos pueden aumentar la absorción de HENILOT® y por lo tanto aumentar la cantidad de HENILOT® en la sangre, posiblemente hasta un nivel peligroso. No debe beber zumo de pomelo o comer pomelo. Puede aumentar la cantidad de HENILOT® en la sangre, posiblemente hasta un nivel peligroso.

Embarazo y lactancia

- **No se recomienda el uso de HENILOT® durante el embarazo** a menos que sea claramente necesario. Si está embarazada o piensa que pudiera estarlo, informe a su médico, quien comentará con usted si puede tomar este medicamento durante el embarazo.
- **Las mujeres que pueden quedar embarazadas** deberán utilizar medidas muy efectivas de anticoncepción durante el tratamiento y hasta dos semanas después de finalizar el tratamiento.
- **No se recomienda la lactancia** durante el tratamiento con HENILOT® y durante las siguientes dos semanas después de la última dosis. Informe a su médico si está en período de lactancia.

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Si nota efectos adversos (como mareos o problemas de visión) que puedan influir en la capacidad de conducir de forma segura o utilizar herramientas o máquinas después de tomar este medicamento, deberá evitar realizar estas actividades hasta que haya desaparecido el efecto.

HENILOT® contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa (también conocido como azúcar de la leche). Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. CÓMO TOMAR HENILOT®

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Qué cantidad de HENILOT® tomar

Uso en adultos

- Pacientes con LMC de nuevo diagnóstico: La dosis recomendada es de 600 mg al día. La dosis se alcanza tomando dos cápsulas duras de 150 mg, dos veces al día.
- Pacientes con LMC que no obtienen beneficio de su tratamiento anterior: La dosis recomendada es de 800 mg cada día. Esta dosis se consigue tomando dos cápsulas de 200 mg dos veces al día.

Uso en niños y adolescentes

- La dosis dada a su hijo dependerá de su peso corporal y de su estatura. El médico calculará la dosis correcta que debe utilizar y le indicará cuáles y cuántas cápsulas de HENILOT® debe darle a su hijo. La dosis diaria total que le da a su hijo no debe superar los 800 mg.

Si su médico puede prescribirle una dosis más baja dependiendo de cómo responda al tratamiento.

Pacientes de edad avanzada (65 años o mayores)

HENILOT® puede utilizarse por pacientes de 65 años o mayores a la misma dosis que el resto de adultos.

Cuándo tomar HENILOT®

Tome las cápsulas duras:

- Dos veces al día (aproximadamente cada 12 horas).
- Al menos 2 horas después de ingerir alimentos.
- Despues esperar 1 hora antes de comer otra vez.

Consulte con su médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cuándo tomar este medicamento. La toma de HENILOT® cada día a la misma hora le ayudará a recordar cuándo debe tomar las cápsulas duras.

Cómo tomar HENILOT®

• Tragar las cápsulas duras enteras con agua.

• No tomar ningún alimento junto con las cápsulas duras.

- No abrir las cápsulas duras excepto si no puede tragárlas. En este caso, puede espolvorear el contenido de cada cápsula dura en una cucharadita de compota de manzana y tomarlo inmediatamente. No utilice más que una cucharadita de compota de manzana para cada cápsula dura y no utilice ningún otro alimento aparte de compota de manzana.

Durante cuánto tiempo tomar HENILOT®

Tome HENILOT® cada día durante el tiempo que le indique su médico. Este es un tratamiento a largo plazo. Su médico controlará periódicamente su situación para comprobar que el tratamiento está teniendo el efecto deseado.

Si su médico puede considerar suspender su tratamiento con HENILOT® en base a unos criterios específicos.

Si tiene dudas sobre cuánto tiempo debe tomar HENILOT®, consulte con su médico.

Si toma más HENILOT® del que debe

Si ha tomado más HENILOT® del que debe, o si otra persona accidentalmente toma sus cápsulas duras, contacte con un médico u hospital rápidamente. Muestre la caja de las cápsulas duras y este prospecto. Puede necesitar tratamiento médico.

Si olvidó tomar HENILOT®

Si se ha olvidado de tomar una dosis, tome la siguiente dosis a su hora habitual. No tome una dosis doble para compensar la cápsula dura olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con HENILOT®

No interrumpa el tratamiento con este medicamento a menos que se lo indique su médico. Interrumpir el tratamiento con HENILOT® sin que se lo haya recomendado su médico le sitúa a usted en un riesgo de empeoramiento de su enfermedad que podría tener consecuencias mortales. Asegúrese de comentarlo con su médico, enfermera y/o farmacéutico si está pensando en interrumpir el tratamiento con HENILOT®.

Si su médico le recomienda suspender el tratamiento con HENILOT®

Si médico evaluará regularmente su tratamiento con una prueba de diagnóstico específica y decidirá si debe continuar tomando este medicamento. Si le indica que suspenda HENILOT®, le seguirá haciendo controles de LMC antes, durante y después de suspender HENILOT® y en caso necesario, le puede indicar que reinicie el tratamiento con HENILOT®.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. La mayoría de las reacciones adversas son de leves a moderadas y normalmente desaparecen después de unos pocos días o semanas de tratamiento.

Algunas reacciones adversas pueden ser graves

- Signos de dolor muscular/esquelético: dolor en las articulaciones y los músculos.
- Signos de trastornos cardíacos: dolor o malestar en el pecho, presión arterial alta o baja, ritmo cardíaco irregular (rápido o lento), palpitations (sensación de latidos rápidos), desmayos, decoloración azul de los labios, lengua o pie.
- Signos de obstrucción de las arterias: dolor, malestar, debilidad o calambres en los músculos de las piernas, que pueden deberse a una disminución del flujo sanguíneo, úlceras en las piernas o que los brazos se curan más lentamente o no se curan y cambios notables de color (azulado o pálid) o de temperatura (frío) en las piernas, brazos, dedos de los pies o de las manos afectados.
- Signos de hipoactividad de la glándula tiroides: aumento de peso, cansancio, pérdida de cabello,

- debilidad muscular, sensación de frío.
- Signos de hiperactividad de la glándula tiroideas: latidos acelerados del corazón, ojos saltones, pérdida de peso, hinchazón en la parte de delante del cuello.
- Signos de trastornos renales o del tracto urinario: sed, piel seca, irritabilidad, oscurecimiento de la orina, disminución de la cantidad de orina, dificultad y dolor al orinar, sensación exagerada de necesidad de orinar, sangre en la orina, color anormal de la orina.
- Signos de niveles elevados de azúcar en sangre: sed excesiva, volumen elevado de orina, aumento del apetito con pérdida de peso, cansancio.
- Signos de vértigo: mareos o sensación de dar vueltas.
- Signos de pancreatitis: dolor intenso en la parte superior del abdomen (medio o izquierdo).
- Signos de trastornos de la piel: bultos rojos dolorosos, dolor en la piel, enrojecimiento de la piel, descamación o ampollas.
- Signos de retención de agua: rápido aumento de peso, hinchazón de manos, tobillos, pies o cara.
- Signos de migraña: dolor de cabeza intenso a menudo acompañado de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz.
- Signos de trastornos de la sangre: fiebre, facilidad para la aparición de hematomas o sangrado inexplicable, infecciones graves o frecuentes, debilidad inexplicable.
- Signos de coagulación dentro de una vena: hinchazón y dolor en una parte del cuerpo.
- Signos de trastornos del sistema nervioso: debilidad o parálisis de las extremidades o la cara, dificultad para hablar, dolor de cabeza intenso, ver, sentir u oír cosas que no existen, cambios en la vista, pérdida del conocimiento, confusión, desorientación, temblores, sensación de hormigueo, dolor o entumecimiento en los dedos de manos y pies.
- Signos de trastornos pulmonares: dificultad para respirar o dolor al respirar, tos, sibilancias con o sin fiebre, hinchazón de pies o piernas.
- Signos de trastornos gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, vómitos con sangre, heces negras o con sangre, estreñimiento, acidez, refljo del estómago, abdomen hinchado.
- Signos de trastornos hepáticos: piel y ojos amarillentos, náuseas, pérdida de apetito, oscurecimiento de la orina.
- Signos de infección hepática: recurrencia (reactivación de la infección por hepatitis B).
- Signos de trastornos oculares: alteraciones visuales que incluyen visión borrosa, visión doble o destellos de luz percibidos, disminución de la nitidez o pérdida de la visión, sangre en el ojo, aumento de la sensibilidad de los ojos a la luz, dolor ocular, enrojecimiento, picor o irritación, sequedad del ojo, hinchazón o picazón de los párpados.
- Signos de desequilibrio eléctrico: náuseas, dificultad para respirar, latidos cardíacos irregulares, turbidez de la orina, cansancio y/o molestias en las articulaciones asociadas con resultados anormales de los análisis de sangre (como niveles altos de potasio, ácido úrico, fósforo y niveles bajos de calcio). Contacte inmediatamente con su médico si notara alguno de los efectos adversos descritos.

Algunas reacciones adversas son muy frecuentes (pueden afectar más de 1 de cada 10 pacientes)

- Diarrea.
- Dolor de cabeza.
- Falta de energía.
- Dolor muscular.
- Picor, erupción.
- Náuseas.
- Estreñimiento.
- Vómitos.
- Pérdida de pelo.
- Dolor en las extremidades, dolor óseo y dolor espinal al suspender el tratamiento con HENILOT®.
- Enlentecimiento del crecimiento en niños y adolescentes.
- Infección del tracto respiratorio superior, incluyendo dolor de garganta y secreción o congestión nasal, estornudos.
- Niveles bajos de las células sanguíneas (glóbulos rojos, plaquetas) o hemoglobina.
- Niveles elevados de lipasa en sangre (función del páncreas).
- Niveles elevados de bilirrubina en sangre (función hepática).
- Niveles elevados de alanina aminotransferasas en sangre (enzimas hepáticas).

Algunas reacciones adversas son frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes)

- Neumonía.
- Dolor abdominal, malestar del estómago después de las comidas, flatulencia, hinchazón del abdomen.
- Dolor en los huesos, espasmos musculares.
- Dolor en el cuello (incluyendo dolor en el cuello).
- Sequedad de la piel, acné, disminución de la sensibilidad de la piel.
- Aumento o disminución de peso.
- Insomnio, depresión, ansiedad.
- Sudores nocturnos, excesiva sudoración.
- Sensación general de malestar.
- Sangrado por la nariz.
- Signos de gota: dolor e hinchazón en las articulaciones.
- Incapacidad para lograr o mantener una erección.
- Síntomas gripales.
- Dolor de garganta.
- Bronquitis.
- Dolor de oído, escuchar ruidos (por ejemplo, pitidos, zumbidos) que no provienen de ninguna fuente externa (también llamado tinnitus).
- Hemorroides.
- Periodos abundantes.
- Picor en los folículos pilosos.
- Candidiasis oral o vaginal.
- Signos de conjuntivitis: secreción del ojo con picor, enrojecimiento e hinchazón.
- Irritación ocular, ojos rojos.
- Signos de hipertensión: presión arterial alta, dolor de cabeza, mareos.
- Sofocos.
- Signos de enfermedad occlusiva arterial periférica: dolor, malestar, debilidad o calambres en los músculos de las piernas, que pueden deberse a la disminución del flujo sanguíneo, úlceras en las piernas o los brazos que cicatrizan lentamente o no cicatrizan y cambios notables de color (azulado o palidez) o de temperatura (frio) de las piernas o brazos (posibles signos de obstrucción de una arteria de la pierna, brazo o dedos de los pies o de las manos afectados).
- Dificultad para respirar (también llamada disnea).
- Llagas en la boca con inflamación de las encías (también llamada estomatitis).
- Niveles elevados de amilasa en sangre (función del páncreas).
- Niveles elevados de creatinina en sangre (función renal).
- Niveles elevados fosfatasa alcalina o de creatina fosfoquinasa en sangre.
- Niveles elevados de aspartato aminotransferasas (enzimas hepáticas) en sangre.
- Niveles elevados en sangre de gamma glutamilttransferasas (enzimas hepáticas).
- Signos de leucopenia o neutropenia: bajo nivel de glóbulos blancos.
- Aumento del número de plaquetas o glóbulos blancos en sangre.

- Niveles bajos de magnesio, potasio, sodio, calcio o fósforo en sangre.
- Aumento de los niveles de potasio, calcio o fósforo en sangre.
- Niveles elevados de grasas en sangre (incluido el colesterol).
- Niveles elevados de ácido úrico en sangre.

Algunas reacciones adversas son poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes)

- Alergia (hipersensibilidad a HENILOT®).
- Sequedad de boca.
- Dolor en las mamas.
- Dolor o malestar en el costado.
- Aumento del apetito.
- Aumento de las mamas en los hombres.
- Infeción por virus del herpes.
- Rigidez de músculos y articulaciones, hinchazón de las articulaciones.
- Sensación de cambio de temperatura en el cuerpo (incluyendo sensación de calor, sensación de frío).
- Sentido del gusto alterado.
- Aumento en la frecuencia de orinar.
- Signos de inflamación del revestimiento del estómago: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal.
- Pérdida de memoria.
- Quiste cutáneo, adelgazamiento o engrosamiento de la piel, engrosamiento de la capa más externa de la piel, decoloración de la piel.
- Signos de psoriasis: parches engrosados de piel roja/plateada.
- Aumento de la sensibilidad de la piel a la luz.
- Dificultad para oír.
- Inflamación de las articulaciones.
- Incontinencia urinaria.
- Inflamación del intestino (también llamada enterocolitis).
- Abceso anal.
- Hinchazón en el pezón.
- Síntomas del síndrome de piernas inquietas (una necesidad irresistible de mover una parte del cuerpo, generalmente la pierna, acompañada de sensaciones incómodas).
- Signos de sepsis: fiebre, dolor torácico, frecuencia cardíaca elevada/aumentada, dificultad para respirar o respiración rápida.
- Infeción de la piel (abceso subcutáneo).
- Verruga de la piel.
- Aumento en un tipo de glóbulos blancos específico (llamados eosinófilos).
- Signos de linfopenia: niveles bajos de glóbulos blancos.
- Niveles elevados de hormona paratiroides en sangre (una hormona que regula los niveles de calcio y fósforo).
- Niveles elevados de lactato deshidrogenasa en sangre (una enzima).
- Signos de niveles bajos de azúcar en la sangre: náuseas, sudoración, debilidad, mareos, temblores, dolor de cabeza.
- Deshidratación.
- Niveles anormales de grasa en la sangre.
- Movimientos involuntarios (también llamado temblor).
- Dificultad para concentrarse.
- Sensación desagradable y/o anormal al tocar (también llamada disestesia).
- Cansancio (también llamada fatiga).
- Sensación de entumecimiento u hormigueo en los dedos de manos y pies (también llamada neuropatía periférica).
- Parálisis de cualquier músculo de la cara.
- Mancha roja en el blanco del ojo causada por vasos sanguíneos rotos (también llamada hemorragia conjuntival).
- Sangre en los ojos (también llamada hemorragia ocular).
- Irritación de ojo.
- Signos de ataque cardíaco (también llamado infarto de miocardio): dolor torácico repentino y opresivo, cansancio, latidos cardíacos irregulares.
- Signos de soplo cardíaco: cansancio, malestar en el pecho, mareo, dolor en el pecho, palpitaciones.
- Infeción fungica de los pies.
- Signos de insuficiencia cardíaca: disnea, dificultad para respirar al acostarse, hinchazón de los pies o las piernas.
- Dolor detrás del esternón (también llamado pericarditis).
- Signos de crisis hipertensiva: dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas.
- Dolor en las piernas y debilidad provocados por caminar (también llamado claudicación intermitente).
- Signos de oclusión de las arterias de las extremidades: posible presión arterial alta, calambres dolorosos en una o ambas caderas, muslos o músculos de la pantorrilla después de realizar ciertas actividades como caminar o subir escaleras, entumecimiento o debilidad en las piernas.
- Hematomas (cuando no te has hecho daño).
- Depósitos de grasa en las arterias que pueden causar obstrucción (también llamada arterioesclerosis).
- Signos de presión arterial baja (también llamada hipotensión): aturdimiento, mareos o desmayos.
- Signos de edema pulmonar: disnea.
- Signos de derrame pleural: acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica (que, si es grave, puede disminuir la capacidad del corazón para bombear sangre), dolor torácico, tos, hipo, respiración acelerada.
- Signos de enfermedad pulmonar intersticial: tos, dificultad para respirar, dolor al respirar.
- Signos de dolor de la pleura: dolor torácico.
- Signos de pleuresia: tos, respiración dolorosa.
- Voz ronca.
- Signos de hipertensión pulmonar: presión arterial alta en las arterias de los pulmones.
- Sibilancias.
- Sensibilidad en los dientes.
- Signos de inflamación (también llamada gingivitis): sangrado de las encías, encías sensibles agrandadas.
- Niveles elevados de urea en sangre (función renal).
- Cambio en las proteinas de la sangre (bajo nivel de globulinas o presencia de paraproteína).
- Niveles elevados de bilirrubina no conjugada en sangre.
- Niveles elevados de troponinas en la sangre.

Algunas reacciones adversas son raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes)

- Enrojecimiento y/o hinchazón y posiblemente descamación de las palmas de las manos y las plantas de los pies (llamado síndrome mano-pie).
- Verrugas en la boca.
- Sensación de endurecimiento o rigidez en las mamas.
- Inflamación de la glándula tiroidea (también llamada tiroditis).
- Estado de ánimo alterado o deprimido.
- Signos de hiperparatiroidismo secundario: dolor óseo y articular, micción excesiva, dolor abdominal, debilidad, cansancio.

- Signos de oclusión de las arterias del cerebro: pérdida de la visión en parte o en la totalidad de los dos ojos, visión doble, vértigo (sensación de que todo da vueltas), entumecimiento u hormigueo, pérdida de coordinación, mareos o confusión.
- Hinchazón del cerebro (posible dolor de cabeza y/o cambios en el estado mental).
- Signos de neurtitis óptica: visión borrosa y pérdida de visión.
- Signos de disfunción cardíaca (fracción de eyeción disminuida): cansancio, malestar en el pecho, mareo, dolor y palpitaciones.
- Niveles bajos o altos de insulina en sangre (una hormona que regula el nivel de azúcar en sangre).
- Niveles bajos del péptido C de insulina en sangre (función del páncreas).
- Muerte subita.

Se han notificado las siguientes reacciones adversas con frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- Signos de disfunción cardíaca (disfunción ventricular): dificultad para respirar, esfuerzo en reposo, latidos cardíacos irregulares, molestias en el pecho, mareos, dolor, palpitaciones, micción excesiva, hinchazón en los pies, tobillos y abdomen.
- Osteonecrosis (muerte de las células del hueso) y rabdomiólisis (destrucción de las células musculares).

5. CONSERVACIÓN DE HENILOT®

- Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y en el blister. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- No conservar a temperatura superior a 30°C.
- Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.
- No utilice este medicamento, si observa que el envase esté dañado o muestra signos de manipulación.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de HENILOT®

- El principio activo es Nilotinib. Cada cápsula dura contiene 150 mg o 200 mg de Nilotinib (como dihidróclorido monohidratado).
- Puesto que las cápsulas contienen lactosa, no se recomienda el uso de Nilotinib en pacientes con problemas hereditarios de intolerancia a la galactosa, deficiencia grave de lactasa o mala absorción de glucosa-galactosa.

Este folleto resume la información más importante de Nilotinib, para mayor información y ante cualquier duda CONSULTE CON SU MÉDICO.

Presentación:

HENILOT® 150 mg: Envase conteniendo 120 cápsulas duras.

HENILOT® 200 mg: Envase conteniendo 120 cápsulas duras.

Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
No use este medicamento si la etiqueta o el envase está dañado.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://anmat.gob.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT respondé 0800-333-1234"

Ud. puede tomar Nilotinib hasta el último día del mes indicado en el envase. No tome Nilotinib luego de la fecha de vencimiento.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 59.279

Elaborado en: Virgilio 844/56, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Elaborador alternativo: Laprida 43, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

Laboratorios IMA S.A.I.C.
Palpa 2862, C1426DPB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Tel: (5411) 4551-5109

Dirección Técnica: Farm. Alejandra I. Fernandes M.N. N° 12.674

Fecha de última revisión: Diciembre 2025

20778 V02